




CORONAVIRUS AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN MONDMASKERS DOOR PROFESSIONALS - SAMENVATTING

WIE MOET EEN CHIRURGISCH MASKER DRAGEN?

Gezondheidstoestand van de professional



Het wordt niet aanbevolen dat werknemers van de instellingen die **geen contact hebben** met de bewoners/begunstigden (administratie, onthaal, techniek ...) regelmatig een masker dragen. Indien zij dat wensen, kunnen zij een stoffen masker dragen.

Gelieve zuinig met de maskers om te gaan.
De voorraad maskers moet achter slot en grendel bewaard worden.

Hoe het masker gebruiken?

✓ Het masker moet worden aangebracht **na het wassen** van de handen met zeep gedurende minstens **40 tot 60 seconden**

Wanneer het masker niet in gebruik is:

- ✓ Het masker mag gedragen worden **rond de hals**
- ✓ Het masker mag bewaard worden in een papieren enveloppe of in **een met de hand wasbare verpakking**

Hoelang mag men het masker gebruiken?

Tot maximaal 8 uur totale behandelingstijd.
Het masker kan worden afgezet wanneer er geen contact is met de zieke bewoner/begunstigde.

- ✗ Raak de voorkant van het masker **NOOIT** aan
- ✗ Bewaar het masker **NOOIT** in een jas- of broekzak
- ✗ Bewaar **NOOIT** een zichtbaar bevuild masker

Verschillen in gebruik

Chirurgisch masker =

Preventie en bescherming voor medische en hulpverlenende professionals die in direct contact staan met patiënten/bewoners/begunstigden met een mogelijke of bevestigde besmetting met COVID-19.

FFP2-masker =

Bescherming voor medische professionals tijdens activiteiten met aerosolisatie (bijvoorbeeld: intubatie, cardiopulmonale reanimatie, tracheotomie ...).

Deze communicatie is enkel geldig in de context van de epidemische fase van het coronavirus. Deze aanbevelingen kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van de epidemie en de beschikbare voorraden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.iriscare.brussels of kunt u contact opnemen met uw inspecteur of controleur. Aanbevelingen van 23 maart 2020.



CORONAVIRUS AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK VAN MONDMASKERS DOOR PROFESSIONALS - DETAILS

WELK MASKER GEBRUIKEN?

CHIRURGISCH MASKER



Preventie en bescherming

- Voor medische en hulpverlenende beroepsprofessionals die in direct contact staan met patiënten/bewoners/behoefstigen begunstigen met mogelijke of bevestigde besmetting met COVID-19.

- Zie "Wie moet een chirurgisch masker dragen?"

"ZELFGEMAAKT" STOFFEN MASKER

- Kan gebruikt worden door personeel dat **niet** in contact komt met **bewoners** of **behoefstigen** begunstigen.

- Moet **dagelijks** gewassen worden op **60°C**.

Bijvoorbeeld:

- Administratief personeel
- Technisch personeel
- Laboratoriumpersoneel
- Onthalend personeel/receptionisten die **geen enkel direct contact** met de patiënten hebben

FFP2-MASKER



Bescherming tijdens handelingen met aerosolisatie

Handelingen die de verspreiding van deeltjes bevorderen die klein en licht genoeg zijn om via de lucht vervoerd te worden.

- Voor medische professionals.

Voorbeelden van behandelingen met aerosolisatie waarbij het FFP2-masker gedragen moet worden:

- Intubatie en gelijkaardige behandelingen
- Cardiopulmonale reanimatie
- Tracheale aspiratie met open circuit
- Bronchoscopie
- Sputum (ophoesten van slijm veroorzaakt door beweging)
- CPAP (combinatie van spontane ademhaling met continue positieve luchtdruk)
- BiPAP (combinatie van spontane ademhaling, ondersteuning bij het inademen en positieve luchtdruk op twee drukniveaus)
- Oxyflow (zuurstoftoedieningssysteem)
- Tracheotomie

Deze communicatie is enkel geldig in de context van de epidemische fase van het coronavirus. Deze aanbevelingen kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van de epidemie en de beschikbare voorraden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.iriscare.brussels of kunt u contact opnemen met uw inspecteur of controleur.

Aanbevelingen van 23 maart 2020.